

Aspirine 50 Coophavet

Vertaling van de originele SPC t.b.v. de vrijstelling voor het gebruik van diergeneesmiddelen bij geiten

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France

FR/V/5748318 2/1992

Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Pot van 1 kg

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Samenstelling

Per gram:

acetylsalicylzuur 0,5 g

Doeldieren

Rund (kalf), varken, pluimvee, paard, schaap (lam), geit (lam)

Indicaties

Rund (kalf), varken, pluimvee, paard, schaap (lam), geit (lam):

Symptomatische behandeling van koorts en lichte tot matige pijn.

Toediening / dosering

Rund (kalf), varken, pluimvee, paard, schaap (lam), geit (lam):

Oraal via de melk, vloeibare voeding of drinkwater.

30 tot 50 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over één of twee toedieningen per dag (overeenkomend met 0,6 g tot 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 2 tot 3 dagen.

Wachttijd

Varken, pluimvee: (orgaan)vlees: 1 dg

Kalf, paard, schaap (lam) en geit

(lam): (orgaan)vlees: 7 dg

Eieren: Bij een afwezigheid van een wachttijd voor eieren, niet gebruiken bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren, in een tijdspanne van 4 weken voor de leg en tijdens de leg.

Contra-indicaties

- Gekende overgevoeligheid voor salicylaten.
- Gebruik bij aanwezigheid van gastro-intestinale ulcera.
- Gebruik bij verhoogd bloedingsrisico.

Bijwerkingen

Hemorragische syndromen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte.

Zorg voor een volledige bescherming van de handen en de slijmvliezen van de luchtwegen.

Ingeval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met veel water.

Ingeval van symptomen na contact met het product (rode huid) vraag raad aan de huisarts en toon de bijsluiter, Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsproblemen zijn ernstigere symptomen die onmiddellijke medische behandeling vereisen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Acetylsalicylzuur veroorzaakt embryo-toxische en teratogene effecten bij laboratoriumdieren.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en

lactatie bij de doeldieren. Gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gebruiken samen met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Verhoogde bloedingsneiging voornamelijk bij dieren in de postpartum periode.

Bewaarcondities / houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.