

Effydral®

Bruistablet voor kalveren

018748 07/13

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE

Registratiehouder:

Zoetis B.V.

Rivium Westlaan 74

2909 LD Capelle a/d IJssel

Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Apotex Nederland, B.V.

Archimedesweg 2

2333 AC Leiden

Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Effydral, bruistablet voor kalveren.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per tablet:

Werkzame bestanddelen:

Natriumchloride	2,34 g
Kaliumchloride	1,12 g
Natriumbicarbonaat	6,72 g
Citroenzuur-anhydraat	3,84 g
Lactose	32,44 g
Glycine	2,25 g

4. INDICATIE(S)

Bestrijding van dehydratie ten gevolge van diarree veroorzaakt door bacteriële en/of virale infectie.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

In geval van een complete obstructie van het maagdarmkanaal dient bij het oraal verstrekken van vloeistoffen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund (kalveren)

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Een gebruiksklare oplossing wordt bereid door het toevoegen van 1 bruistablet aan 1 liter

handwarm (circa 37 °C) water. Bereid deze oplossing zo kort mogelijk voor de verstrekking aan het kalf en maak hierbij steeds gebruik van schoon water en schone emmers. Door het toevoegen van één bruistablet aan één liter water ontstaat een gebruiksklare, isotone oplossing met de volgende samenstelling:

Bestanddeel:	Hoeveelheid per liter gebruiksklare oplossing:
Natrium	120 mmol
Kalium	15 mmol
Chloor	55 mmol
Bicarbonaat + citraat	80 mmol*
Lactose	90 mmol**
Glycine	30 mmol

* Hoeveelheid alkaliserende bestanddelen, uitgedrukt in bicarbonaat-equivalenten.

** 90 mmol lactose is equivalent met 180 mmol glucose.

Direct bij het waarnemen van diarree dient de (kunst)melkvoeding te worden gestaakt. In plaats van de normale (kunst)melkgift wordt het kalf gedurende twee dagen, tweemaal daags, twee tot drie liter van de gebruiksklare oplossing gegeven.

Gedurende de volgende twee dagen wordt het kalf tweemaal daags één tot anderhalve liter van de gebruiksklare oplossing, gemengd met een gelijke hoeveelheid (kunst)melk gegeven.

Meestal kan daarna de normale (kunst)melkvoeding worden hervat. Overleg zo nodig met uw dierenarts over de wijze van vervolgen van de behandeling.

Indien het kalf ernstig is gedehydrateerd dient de verstrekking van het middel te worden verdeeld over 3 tot 4 giften per dag.

Indien gewenst kan een kalf gedurende 4 dagen uitsluitend de gebruiksklare oplossing worden gegeven zonder dat nadelige gevolgen optreden.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor oraal gebruik.

Zo nodig kan voor de toediening van de gebruiksklare oplossing een slokdarmsonde worden gebruikt.

10. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Oplossing direct gebruiken, niet bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Indien kalveren van het middel een te geconcentreerde oplossing hebben genomen, dient in ruime mate drinkwater te worden verstrekt.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

11 juli 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

REG NL 8445

Kanalisisatie: VRIJ